



# Insufficienza venosa cronica ed emorroidi: un'unica soluzione!

Aprile 2023.2

L'insufficienza venosa cronica periferica e la patologia emorroidaria sono strettamente connesse e possono impattare sulla qualità di vita e sul riposo del paziente. Avere a disposizione un preparato efficace tanto sulle emorroidi quanto sull'insufficienza venosa cronica periferica significa avere l'opportunità di gestire più efficacemente entrambe le problematiche. Sulla base della multifattorialità dell'insufficienza venosa cronica (IVC) e delle sue diverse manifestazioni patologiche, è stato sviluppato **Emospid®**. Si tratta di una formulazione multistrato che prevede il rilascio programmato di tre ingredienti vegetali, selezionati e combinati per avere un'azione sinergica nel contrasto dei sintomi e delle cause dell'insufficienza venosa cronica periferica.

Lo studio italiano [A preparation of procyanidol oligomers, triterpenes and anthocyanosides in chronic venous insufficiency and haemorrhoids](#) ha indagato l'efficacia di Emospid® nell'insufficienza venosa cronica.

## Emospid® in pazienti con IVC

Nello studio sono stati arruolati 50 pazienti, tra i 37 e i 60 anni, con diagnosi di insufficienza venosa cronica. I pazienti hanno assunto 3 compresse di Emospid® al giorno per 30 giorni e a seguire 2 compresse al giorno per 60 giorni. A distanza di 45 e 90 giorni, sono stati valutati i sintomi dell'insufficienza venosa cronica agli arti inferiori, come dolore, pesantezza, prurito, irrequietezza motoria e crampi e della concomitante presenza di patologia emorroidaria (dolore, pesantezza, prurito), in una parte dei pazienti.

## Quali risultati?

Già dopo 45 giorni di assunzione di **Emospid®** è stata registrata una diminuzione:

- dell'80% di dolore e pesantezza agli arti inferiori
- dell'85% di prurito
- del 65% di irrequietezza motoria
- del 59% di crampi.

Dopo 90 giorni, è stata evidenziata una remissione del 98% di tutti i sintomi correlati all'insufficienza venosa cronica. Inoltre, l'edema è stato ridotto del 74% dopo 45 giorni di trattamento, con miglioramento ulteriore al termine dei 90 giorni dello studio. La circonferenza della caviglia ha mostrato una riduzione di 2,3 cm dopo 45 giorni e di 3,8 cm dopo 90 giorni di trattamento.

Nei pazienti che presentavano anche patologia emorroidaria è stato evidenziato un significativo miglioramento di tutti i sintomi, confermando i risultati ottenuti in un altro studio.

Tolleranza e aderenza al trattamento sono stati eccellenti.

Lo studio mette in luce i benefici apportati dall'utilizzo di Emospid® nel contrasto ai sintomi dell'insufficienza venosa cronica.

**Emospid®**, infatti, permette di proteggere la parete vascolare attraverso gli oligomeri procianidolici (OPC) del Leucoselect Fitosoma®, ristrutturare la tonaca vasale stimolando la produzione di collagene attraverso i triterpeni della *Centella asiatica* e riparare il danno e la degenerazione vascolare attraverso l'estratto di *Vaccinium myrtillus* noto come Mirtoselect®.

**Leucoselect® Fitosoma® 100 mg**  
**Frazione triterpenica purificata**  
**di Centella asiatica 30 mg**  
**Mirtoselect® 80 mg**

**1/3 cpr die**

